

Veckorapport - Linköping vecka 17

Vi har börjat med en första gradering av höstsådda grödor i Östergötland (E). Den kommande veckan tillkommer ytterligare graderingar framförallt från Södermanlands (D) och Örebro län (T).

Veckorapporten baseras på avläsningar av skadegörare i obehandlade rutor. Angrepp av svampsjukdomar graderas på de tre översta bladen. Insektsgraderingar görs på 25 strån respektive 25 plantor.

Gulskålar för fångst av insekter är placerade i höstrapsfält. Skålarna töms och undersöks en gång i veckan. Gulskålar finns i Östergötland, ytterligare kommer till i Södermanland och Örebro den närmaste veckan.

Vädret

Förra veckan var det fortsatt kallt och blåsigt väder med morgonfrost på en del platser. De flesta prognosfält fick 4-5 mm nederbörd men det varierade mellan 1 och 10 mm.

Höstvete

DC 23 (21-30)

25 fält

Höstvetet är i bestockningsfasen, ett fält av sorten Linus har kommit till utvecklingsstadium 30. De flesta fält har **svartpricksjuka** på de äldsta bladen. Även gammal **mjöldagg** förekommer på de äldsta bladen. I övrigt inga sjukdomar.

Tabell 1. Antal höstvetefält efter skadegörare (% angripna blad 1-3). Medelvärden för denna och föregående vecka.

% ang blad 1-3	0	0 - 15	15 - 30	30 - 60	60 - 100	Medel v.17	Medel v.16
Mjöldagg	18	6	0	0	0	0.9	-
Svartpricksjuka	0	6	11	7	0	23	-
Vetets bladfläcksjuka	24	0	0	0	0	0.0	-
Bladfläcksvampar	0	6	11	7	0	23	-
Brunrost	24	0	0	0	0	0.0	-
Gulrost	24	0	0	0	0	0.0	-

Råg

DC 31 (31-32)

4 fält

Rågfälten är i tidig stråskjutning. **Sköldfläcksjuka** förekommer på de äldsta bladen i tre av fälten. Enstaka pustlar av **brunrost** förekommer på de äldre bladen i ett fält, i samma fält finns också gammal **mjöldagg**.

Tabell 2. Antal rågfält efter skadegörare (% angripna blad 1-3). Medelvärden för denna och föregående vecka.

% ang blad 1-3	0	0 - 15	15 - 30	30 - 60	60 - 100	Medel v.17	Medel v.16
Mjöldagg	3	1	0	0	0	2.5	-
Sköldfläcksjuka	0	3	1	0	0	12	-
Brunrost	3	1	0	0	0	0.5	-

Rågvete

DC 24 (22-24)

2 fält

I de två rågvetefält som blivit graderade finns det små angrepp av **bladfläcksvampar** samt gammal **mjöldagg** på de äldre bladen. Inga andra sjukdomar har hittats.

Tabell 3. Antal rågvetefält efter skadegörare (% angripna blad 1–3). Medelvärden för denna och föregående vecka.

% ang blad 1–3	0	0 – 15	15 – 30	30 – 60	60 – 100	Medel v.17	Medel v.16
Brunrost	2	0	0	0	0	0.0	-
Bladfläcksvampar	0	2	0	0	0	5	-
Sköldfläcksjuka	2	0	0	0	0	0.0	-
Mjöldagg	1	1	0	0	0	3.0	-
Gulrost	2	0	0	0	0	0.0	-

Höstkorn

DC 30 (23-30)

6 fält

Tre av fälten är i utvecklingsstadium 30, de andra tre är i bestockningsfasen. I två fält finns pustlar av kornrost på de äldre bladen. Fyra fält har gammal mjöldagg på de äldre bladen. I övrigt inga sjukdomar. I alla sex fält finns en hel del sortfläckar.

Tabell 4. Antal höstkornfält efter skadegörare (% angripna blad 1–3). Medelvärden för denna och föregående vecka.

% ang blad 1–3	0	0 – 15	15 – 30	30 – 60	60 – 100	Medel v.17	Medel v.16
Ramularia	6	0	0	0	0	0.0	-
Kornets bladfläcksjuka	6	0	0	0	0	0.0	-
Sköldfläcksjuka	6	0	0	0	0	0.0	-
Mjöldagg	2	3	0	1	0	10	-
Kornrost	4	1	1	0	0	4.3	-

Vårsäd

Några fält har börjat komma upp men det finns också fält som ännu inte blivit sådda. Temperatursummorna i området är låga och ligger runt 30.

Höstoljevaxter

DC 51 (51-52)

9 fält i E-län

Höstrapsen är fortfarande i tidigt knoppstadium och känslig för angrepp av **rapsbagg**. Det fortsatt kalla och blåsiga vädret gör att rapsbaggarna flyger kortare sträckor. Fångsterna av både rapsbagg och **fyrtdandade rapsvivlar** har ökat lite men är än så länge på låga nivåer. Enstaka **blåvingade rapsvivlar** fångas också i gulskålarna. Betydelsen av de stjälskadorna som de blåvingade- och fyrtdandade rapsvivlarna gör är oftast av liten betydelse.

Växtskyddscentralen Linköping



Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling: Europa
investerar i landsbygdsområden