

Veckorapport - Skara vecka 39, 2022

Veckans gulskålsfångster i höstraps visar på en fortsatt inflygning av rapsjordloppa i många fält men är mindre än under 2021. En stor ökning av blåvingad rapsvivel har noterats i flera fält den senaste veckan dock är erfarenheterna från tidigare år att skadorna har varit av liten betydelse.

Rapsjordloppa

Det är stora variationer av fångster av rapsjordloppa den senaste veckan. I en tredjedel av fälten har inflygningen upphört men i flera fält har inflygningen fortsatt, se tabell 1. Hittills under hösten har 15 % av fälten gått över riktvärdet för bekämpning när larvskador riskeras.

Riktvärde för bekämpning av larvskador: 50-100 rapsjordloppor/10 dm² i ackumulerad fångst under de tre senaste veckorna. För att förhindra äggläggning sätts bekämpning in inom 10 dagar efter uppnått tröskelvärde. Tidigare år har vi i Mellansverige inte kunnat se att larverna orsakat någon utvintring eller påverkan på blomningen när förekomsten är upp till 100 rapsjordloppor/10 dm² skålyta. Därför rekommenderar vi att skålfångsten ska ligga i det övre intervallet, minst 100 rapsjordloppor per 10 dm² för bekämpning.

Ägg från rapsjordloppor som flugit in senaste veckan hinner inte kläckas

Rapsjordloppans ägg kläcks efter 200 daggrader med en bas på 4 grader. Detta medför att ägg från rapsjordloppor som flugit in från sista veckan i september med stor säkerhet inte hinner kläckas till larver. Detta mot bakgrund av väderdata från de senaste höstarna. Ta hjälp av vår e-tjänst att räkna fram daggrader i ditt område <https://etjanst.sjv.se/povpub-gui/#/prognosmodeller/tempsumma?produktionsinriktning=jordbruk>

Kålbladsstekel

Vi fångar någon enstaka vuxen individ av **kålbladsstekel**. I några fält förekommer enstaka larver.

Blåvingad rapsvivel

Denna vecka ser vi nu en ökning av **blåvingad rapsvivel** i flera fält. Det finns ingen tröskel för skålfångster av blåvingad rapsvivel. Den blåvingade rapsviveln flyger in på hösten men lägger sina ägg först tidig vår och därmed påverkas inte övervintringen av larvskador som hos rapsjordloppan. Äldre försök har visat att angreppen oftast har varit av marginell betydelse trots stor förekomst av blåvingade rapsvivelar.

Minor av flugor

Det har blivit vanligare i fält att vi hittar minor av rapsflugor på blad. Angreppen saknar betydelse.

Tabell 1. Skålfångster av rapsjordloppa, veckovis 2022. Nedan i tabellen anges veckofångsten fram till angivet datum samt den totala fångsten de senaste tre veckorna.

Plats	Utv. stadium vid senaste avläsningen	Skålfångst/10 dm ²					Fångst/10 dm ² , de senaste tre veckor
		29/8	5/9	12/9	19/9	26/9	
Älvsborg							
Bolstad	15	0	3	14	12	7	33
Brålanda	16	12	8	8	5	6	19
Erikstad	15	1	7	16	9	10	35
Skaraborg							
Kålland 2	17	205	34	36	43	1	80
Gråstorp 1	15	6	0	7	0	0	7
Skara	15	-	26	35	0	0	35
Vara	15	6	11	25	3	0	28
Norra Härene	15	8	7	56	3	18	77
Larv	16	48	-	38	5	-	43
Lavad	15	2	5	12	9	6	27
Lundsbrunn	16	3	3	30	2	26	58
Kvänum	16	1	34	33	1	0	34
Kålland 1	17	9	19	59	7	1	67
Gråstorp 2	15	12	0	3	1	0	4
Stora Levene	15	9	22	50	2	1	53
Vinninga	15	0	15	34	19	7	60
Värsås	15	3	0	10	21	21	52
Skövde	15	10	16	50	19	12	81
Mariestad	14	0	1	19	2	24	45
Hjo	17	21	19	52	28	23	103
Moholm	15	0	5	12	3	10	25
Väring	13	-	0	1	0	18	19
Tidaholm	16	6	9	23	14	12	49
Falköping	13	-	1	14	11	7	32

Växtskyddcentralen Skara



Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden