

## Veckorapport - Linköping vecka 34, 2021

### Gulskålfångster i höstraps

För att följa förekomsten och värdera behovet av bekämpning mot skador av rapsjordloppan och andra insekter, har vi i samarbete med Lovangs lantbrukskonsult, gula fångstskålar utsatta i fält i Östergötland och Örebro län. Vi kommer att få in avläsningar från ytterligare skålar kommande veckor. Värdena kommer att redovisas i veckorapporten.

### Rapsjordloppa

Rapsjordloppan kan orsaka två sorters skador, gnagskador vid uppkomst och utvintringsskador på grund av larvangrepp.

**Riktvärde gnagskador:** i medeltal mer än 10 % uppäten bladyta i tidiga utvecklingsstadier, 2-4 utvecklade örtblad.

**Bekämpningströskel larvskador:** ca 50-100 rapsjordloppor/10 dm<sup>2</sup> i ackumulerad fångst under tre veckor. För att hindra äggläggning sätts bekämpning in inom 10 dagar efter uppnått tröskelvärde. Erfarenheter från de senaste åren är att skadorna av rapsjordloppans larver varit obetydliga trots skålfångster högt över riktvärdet. Därför rekommenderar vi att skålfångsten ska ligga i det övre intervallet, runt 100 rapsjordloppor per 10 dm<sup>2</sup>, innan du överväger en bekämpning.

Bekämpningen görs med en pyretroid.

**Tabell 1.** Skålfångster veckovis 2021 v33 – 34 och den totala ackumulerade fångsten de senaste tre veckorna.

Plats	Utv. stadium vid senaste avläsningen	Skålfångst / 10 dm <sup>2</sup>								Ackumulerad fångst / 10 dm <sup>2</sup> (senaste 3 veckor)
		16/8	23/8							
Västra Östergötland										
Mantorp 1	9	2	14							16
Mantorp 2	12	0	8							8
Klockrike 1	9	-	5							5
Klockrike 2	10	0	0							0
Varv	10	0	2							2
Borghamn 1	11	2	0							2
Borghamn 2	10	-	2							2
Väderstad	10	0	1							1
Fornåsa	11	2	24							26
Skänninge	10	0	2							2
Fågelstad	12	2	4							6
Hagebyhöga	13	2	4							6
Vadstena	11	0	2							2

