

## Veckorapport - Kalmar vecka 37, 2021

### Bladlöss i sugfällor

Nu förekommer bladlöss i sugfällan på Ingelstorp utanför Kalmar. Värde inom parentes gäller sugfälla i Alnarp.

Vecka 37: 62 st (72)

2020 vecka 37: 8 st (4)

2014 vecka 37: 81 st (56)

### Rapsjordloppa & kålbladstekel – skålfångst och fältavläsning

Tabell 1. Skålfångster veckovis 2021 v35 – 37 och den totala ackumulerade fångsten de senaste tre veckorna.

Plats	Utv. stadium vid senaste avläsningen	Skålfångst / 10 dm <sup>2</sup>							Ackumulerad fångst / 10 dm <sup>2</sup> (senaste 3 veckor)
		30/8	6/9	13/9					
<b>Öland</b>									
Albrunna Södra Möckleby	13	0	0	10					10
Dyestad Runsten	13	1	10	2					13
Gettlinge Södra Möckleby	12	0	4	141					145
Hörninge Köpingsvik	15	1	8	22					31
Karlevi Färjestaden	12	1	1	34					36
Karse Köpingsvik	14	0	0	2					2
Kåtorp Färjestaden	12	0	63	3					66
Långlöt Borgholm	12	0	5	16					21
<b>Kalmar</b>									
Fredrikslund Igelösa	12	0	0	58					58
Kulltorp Vassmolösa	12	0	10	263					273
Kölby Ljungbyholm	12	0	37	60					97
Mönsterås	10	-	9	-					9
Smedby Kalmar	12	1	37	240					278
Svartingstorp Rockneby	13	5	0	41					46
<b>Gotland</b>									
Hägvide Stånga	13	-	49	230					279
Kaungs Väskinde	13	-	3	154					157
Lokrume Nyplings	11	-	5	-					5
Norrby Rosendal Barlingbo	12	-	49	470					519
Ragnsarve Hemse	14	3	3	48					54
Roma kungsgård Björke	12	-	8	6					14
Wejde lantbruk	12	-	2	48					50

Utvecklingsstadier: 09= rapsen på väg upp, 10 = hjärtbladen helt utvecklade, 11 = 1 örtblad, 12= 2 örtblad etc

Bekämpningströskeln nådd i många fält för bekämpning av **rapsjordloppans larver** inför vintern. Det är detta som fångstskälarna i huvudsak är till för. **Bekämpa inom 10 dagar där bekämpningströskeln är nådd. I fält med bara strax över 50 rapsjordloppor på tre veckor avvakta** nästa veckas avläsning.

**Gnagskador av rapsjordloppa** finns i många fält, men rapsen har nu minst två örtblad och det är **inte troligt att det finns bekämpningsbehov mot gnagskador**.

**Kålbladstekel**. finns i ett par prognosfält på Öland. Bekämpningströskeln är inte uppnådd. Var uppmärksam på larven den kommande tiden.

**Åkersnigel** förekommer inte i stort sett inte prognosfälten.

Rapsjordloppa gör oftast små runda hål inne i bladet. Sniglar gör mera oregelbundna bladnag och oftast i bladkanterna. Kontrollera gärna fälten med ficklampa när det är mörkt, för att upptäcka rapsjordlopporna på plantorna. Sniglarnas slemspår som syns tydligast morgon och kväll. Lägg lite havregryn under gulskålen som en snigelfälla.

**Bekämpningströsklar:**

**Riktvärde gnagskador av rapsjordloppa:** Mer än 5 % uppäten bladyta i hjärtbladsstadiet och mer än 10 % uppäten bladyta i DC 11-12.

**Riktvärde för larvskador:** 50-100 rapsjordloppor/10 dm<sup>2</sup> i ackumulerad fångst på tre veckor. Bekämpning inom 10 dagar efter uppnått riktvärde.

**Riktvärde för kålbladstekel:** en larv per planta. Bekämpningen sätts in när skadorna ser hotande ut.

**Sniglar:** En snigel per fälla (ca 6 dm<sup>2</sup>) och dag.  
Se även Växtskyddsbrev nr 25.

**Växtskyddcentralen Kalmar**

Linda af Geijersstam 072-973 56 13 - [linda.afgeijersstam@jordbruksverket.se](mailto:linda.afgeijersstam@jordbruksverket.se)

Annika Sohlman 073-205 49 92

Instagram vaxtskyddscentralenkalmar

