

## Veckorapport - Linköping år 2022 vecka 18

Veckorapporten baseras på avläsningar av skadegörare i obehandlade rutor i och Södermanlands län (D), Östergötlands län (E) och Örebro län (T). Angrepp av svampsjukdomar graderas på de tre översta bladen. Insektsgraderingar görs på 25 strån respektive 25 plantor.

### Vädret

Det har varit torrt i hela regionen den senaste veckan och de nysådda vårgrödorna är i stort behov av regn.

### Höstvete

DC 23 (21-30)

55 fält

Höstvetet är i bestockningsfasen. De flesta fält har **svartpricksjuka** på de äldsta bladen. Även gammal **mjöldagg** förekommer på de äldsta bladen i några fält. I övrigt inga sjukdomar.

### Skadegörare

Tabell 1. Antal höstvetefält efter skadegörare (% angripna blad 1–3). Medelvärden för denna och föregående vecka.

% ang blad 1–3	0	0 – 0.01	0.01 – 30	30 – 60	60 – 100	Medel 2022 v.18	Medel 2022 v.17
Mjöldagg	49	0	6	0	0	0.5	-
Svartpricksjuka	7	3	45	0	0	11	-
Vetets bladfläcksjuka	54	1	0	0	0	0.0	-
Bladfläcksvampar	7	3	45	0	0	11	-
Brunrost	55	0	0	0	0	0.0	-
Gulrost	55	0	0	0	0	0.0	-

### Råg

DC 31 (21-31)

5 fält

De flesta rågfälten är i tidig stråskjutning, DC 31, då man kan känna den första noden.

**Sköldfläcksjuka** förekommer på de äldsta bladen i tre av fälten.

### Skadegörare

Tabell 2. Antal rågfält efter skadegörare (% angripna blad 1–3). Medelvärden för denna och föregående vecka.

% ang blad 1–3	0	0 – 0.01	0.01 – 30	30 – 60	60 – 100	Medel 2022 v.18	Medel 2022 v.17
Mjöldagg	4	0	1	0	0	0.4	-
Sköldfläcksjuka	2	0	3	0	0	2.0	-
Brunrost	5	0	0	0	0	0.0	-

## Rågvete

DC 23 (22-30)

9 fält

Rågvetet är fortfarande i bestockningsfasen. Endast svartpricksjuka på äldre blad i ett enstaka fält. Inga andra sjukdomar har hittats.

### Skadegörare

Tabell 3. Antal rågvetefält efter skadegörare (% angripna blad 1–3). Medelvärden för denna och föregående vecka.

% ang blad 1–3	0	0 – 0.01	0.01 – 30	30 – 60	60 – 100	Medel 2022 v.18	Medel 2022 v.17
Brunrost	9	0	0	0	0	0.0	-
Bladfläcksvampar	8	0	1	0	0	1.6	-
Sköldfläcksjuka	9	0	0	0	0	0.0	-
Mjöldagg	9	0	0	0	0	0.0	-
Gulrost	9	0	0	0	0	0.0	-

## Höstkorn

DC 30 (24-30)

6 fält

Höstkornet är i begynnande stråskjutning, DC 30. Ett fält hade svaga angrepp av kornrost, för övrigt inga sjukdomar.

### Skadegörare

Tabell 4. Antal höstkornfält efter skadegörare (% angripna blad 1–3). Medelvärden för denna och föregående vecka.

% ang blad 1–3	0	0 – 0.01	0.01 – 30	30 – 60	60 – 100	Medel 2022 v.18	Medel 2022 v.17
Ramularia	6	0	0	0	0	0.0	-
Kornets bladfläcksjuka	6	0	0	0	0	0.0	-
Sköldfläcksjuka	6	0	0	0	0	0.0	-
Mjöldagg	6	0	0	0	0	0.0	-
Kornrost	5	0	1	0	0	0.7	-

## Vårsäd

Vårsädden är överlag avklarad. I Östergötland har det första bladet växt fram medan det i Örebro och Södermanland fortfarande inte brutit igenom markytan.

### Fritfluga Daggrader – temperatursummer 3 maj

- Horn (E) 46
- Malmslätt (E), 41
- Örebro (T) 57
- Floda (D) 50

Tillskottet den senaste veckan har varit cirka 10 daggrader

## Höstraps

## DC 52 (52-55)

11 fält

Höstrapsen är i medelsent knoppstadium och känslig för angrepp av **rapsbaggar**. Det fortsatt kalla och blåsiga vädret gör att rapsbaggarna flyger kortare sträckor. Fångsterna av både rapsbaggar och **fyrtrandade rapsvivel** har ökat men är än så länge på låga nivåer. Enstaka **blåvingade rapsvivel** fångas också i gulskålarna. Betydelsen av de stjälskador som de blåvingade- och fyrtrandade rapsvivelarna gör är oftast av liten betydelse.

## Fällfångster

Tabell 1. Antal fällfångster. Medelvärden för denna och föregående vecka.

Antal/fälla	0 – 1	1 – 10	10 – 50	50 – 100	100 –	Medel 2022 v.18	Medel 2022 v.17
Fyrtrandad rapsvivel	0	8	3	0	0	9	1.7

Tabell 2. Antal fällfångster. Medelvärden för denna och föregående vecka.

Antal/fälla/dygn	0	0 – 2	2 – 4	4 – 6	6 –	Medel 2022 v.18	Medel 2022 v.17
Rapsbagge	0	8	2	1	0	1.6	0.4

## Växtskyddscentralen Linköping



Europeiska jordbruksfonden för  
landsbygdsutveckling; Europa  
investerar i landsbygdsområden