

Veckorapport - Skara år 2022 vecka 18

Veckorapporten baseras på avläsningar av skadegörare i obehandlade rutor i Västra Götalands län (O) och Värmlands län (S). Angrepp av svampsjukdomar graderas på de tre översta bladen. Insektsgraderingar görs på 25 strån respektive 25 plantor.

Vädret

Mycket torr väderlek har dominerat april månad och fortsätter nu in i maj.

Höstvete

DC 30 (22-31)

36 fält

Höstvetet är i tidig stråskjutning. **Svartpricksjuka** finns enbart på gamla blad, i medeltal 8 %. Endast svagt angrepp av **vetets bladfläcksjuka** i ett fält. Ingen **gulrost** noterad och inte heller någon rapporterad. Två fält svaga angrepp av **mjöldagg**.

Tabell 1. Antal höstvetefält efter skadegörare (% angripna blad 1–3). Medelvärden för denna och föregående vecka. Sorter: Ahoi 3, Brons 4, Ceylon 1, Elvis 1, Etana 5, Hallfreda 1, Informer 4, Julius 4, Linus 3, Norin 3, RGT Reform 5, Okända 2.

% ang blad 1–3	0	0.01	2 – 30	30 – 60	60 – 100	Medel 2022 v.18	Medel 2022 v.17
Mjöldagg	30	0	2	0	0	0.1	0
Svartpricksjuka	2	1	33	0	0	8	3.7
Vetets bladfläcksjuka	32	0	1	0	0	0.1	0
Bladfläcksvampar	3	0	33	0	0	8	3.5
Brunrost	33	0	0	0	0	0	0
Gulrost	33	0	0	0	0	0	0

Råg

DC 32 (31-32)

5 fält

Rågen är i stråskjutning. Det finns svaga angrepp av **sköldfläcksjuka** i alla fälten. Ingen **mjöldagg** eller **brunrost**.

Tabell 2. Antal rågfält efter skadegörare (% angripna blad 1–3). Medelvärden för denna och föregående vecka. Sorter: KWS Serafino 2, KWS Tayo 1, okänd 1.

% ang blad 1–3	0	0.01	2 – 30	30 – 60	60 – 100	Medel 2022 v.18	Medel 2022 v.17
Mjöldagg	5	0	0	0	0	0	0
Sköldfläcksjuka	0	2	3	0	0	2.4	3.2
Brunrost	5	0	0	0	0	0	0

Rågvete

DC 31 (30-31)

4 fält

Rågvete är i tidig stråskjutning. Svaga angrepp av **bladfläcksvampar** i två av de fyra fälten och **mjöldagg** i ett av fälten. Ingen **gulrost** noterad eller rapporterad.

Höstkorn DC 31 (24-32) 4 fält

Höstkorn är i början av stråskjutningen, i medeltal DC 31. Angrepp av **mjöldagg** finns i två fält med ett medeltal på 8 %. **Sköldfläcksjuka** finns i tre fält med i medeltal 7 % och som 14 % angripna blad. **Kornrost** finns i två fält, båda i sorten KWS Orbit. Fysiologiska fläckar är vanligt förekommande.

Höstraps DC 55 (52-57) 9 fält

I flertalet höstrapsfält har grödan passerat medelsent knoppstadium (DC 52-53). Plantorna är känsliga för angrepp av **rapsbaggar**. Men hittills har förekomsten i prognosfälten varit mycket liten. Vid avräkningar på plantor har bara några enstaka rapsbaggar noterats i två av fälten. Fortsatt kallt och blåsigt väder med låg aktivitet bland insekter överlag, visar sig också i fångsterna i gulskålar som är mycket små. Det gäller också **fyrtrandad rapsvivel** med mycket små fångster i nästa samtliga fält. Enstaka vuxna **rapsjordloppor** har noterats i fångsterna också den senaste veckan. Inga apothecier uppkomna i våra nedgrävda apotheciedepåer.

Tabell 4. Antal höstrapsfält efter skadegörare (antal/planta). Medelvärden för denna och föregående vecka.

antal/planta	0	0 – 2	2 – 4	4 – 6	6 –	Medel 2022 v.18	Medel 2022 v.17
Rapsbagge	7	2	0	0	0	0	0

Vårstråsäd

Graderingar i fält med vårsäd börjar i nästa vecka. Uppmätta daggrader för fritfluga till och med 3 maj är som följer: Arvika: 51, Karlstad: 42 , Hällum: 48 och Jönköping: 37.

Växtskyddcentralen Skara



Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling: Europa
investerar i landsbygdsområden