

Prognos och Varning

LFRIS

Jordbruk

Uppsala

< Gå tillbaka

Skriv ut

Veckorapport - Uppsala år 2025 vecka 25

Veckorapporten baseras på avläsningar av skadegörare i obehandlade rutor i Stockholms län (AB), Uppsala län (C), Västmanlands län (U), Dalarnas län (W) och Gävleborgs län (X). Angrepp av svampsjukdomar graderas på de tre översta bladen. Insektsgraderingar görs på 25 strån respektive 25 plantor.

Väder

Det har varit stor variation i mängden nederbörd med allt från 9 mm till 34 mm och stora skillnader även inom länen. Temperaturen steg under helgen till över 25 °C.

HöstveteDC 59 (51-69)54 fält (8 i AB län, 35 i C län, 9 i U län, 2 i W län, 0 i X län)

Antalet graderingsfält med **gulrost** hade mer än dubblerats från föregående vecka och hittades nu i 25 graderingsfält, där angreppet i flera fält hade ökat med ca 30 procentenheter bara under den senaste veckan. De drabbade sorterna var Julius (4), Kask (8), KWS Ahoi (6), Norin (3), Praktik (1), RGT Reform (2), Etana (1) och Informer (1). Störst medelangrepp konstaterades i sorten Norin. Fynden gjordes i Stockholms län (4), Västmanlands län (4) och Uppsala län (17), men det fanns även angrepp i övriga län, i fält utanför graderingsverksamheten. Vädret i maj och början på juni har varit gynnsamt för gulrost. Etana och Informer, som är mindre känsliga för gulrost, har även de fått mindre angrepp.

Vetets bladfläcksjuka hade ökat i majoriteten av de 31 angripna graderingsrutorna och ett par fält hade nära 100 % angrepp. Angreppsnivån av **svartpricksjuka** var fortsatt låg.

Bladlöss noterades i några enstaka fält i små mängder.

Graderade sorter i höstvete var 1 Brons, 5 Chevignon, 9 Etana, 2 Informer, 8 Julius, 11 Kask, 6 KWS Ahoi, 1 Linus, 3 Norin, 1 Praktik och 5 RGT Reform.

Skadegörare

Tabell 1. Antal höstvetefält efter skadegörare (% angripna blad 1–3). Medelvärden för denna och föregående vecka.

% ang blad 1–3	0	>0 – 15	>15 – 30	>30 – 60	>60 – 100	Medel 2025 v.25	Medel 2025 v.24
Mjöldagg	50	4	0	0	0	0.1	0
Svartpricksjuka	28	26	0	0	0	0.3	0.2
Vetets bladfläcksjuka	22	21	6	2	3	11	4.7
Brunrost	53	0	0	0	0	0	0
Gulrost	27	19	2	4	1	6.6	2.8

VårveteDC 37 (30-45)12 fält (8 i C län, 2 i U län, 2 i W län)

Vetets bladfläcksjuka noterades i fyra graderingsrutor, där bestånden vuxit ifrån sjukdomen något, med minskad angreppsgrad som följd. Vete fanns som för- eller förförfrukt i dessa fält.

Enstaka fynd av **gulrost** har gjorts i norra Upplands län i sorten Quarna (DC 37), samt utanför graderingsverksamheten i södra Gävleborgs län i sorten Flippen (begynnande stråskjutning).

Graderade sorter var Diskett, Flippen, Quarna och KWS Pensum.

Skadegörare

Tabell 2. Antal vårvetefält efter skadegörare (% angripna blad 1–3). Medelvärden för denna och föregående vecka.

% ang blad 1–3	0	>0 – 15	>15 – 30	>30 – 60	>60 – 100	Medel 2025 v.25	Medel 2025 v.24
----------------	---	---------	----------	----------	-----------	-----------------	-----------------

Vetets bladfläcksjuka	8	4	0	0	0	1.3	5.8
-----------------------	---	---	---	---	---	-----	-----

Tabell 3. Antal vårvetefält efter skadegörare (antal/strå). Medelvärden för denna och föregående vecka.

antal/strå	0	>0 – 3	>3 – 6	>6 – 12	>12	Medel 2025 v.25	Medel 2025 v.24
Havrebladlus	12	0	0	0	0	0	0

Vårkorn

DC 45 (21-51)

35 fält (5 i AB län, 20 i C län, 5 i U län, 4 i W län, 1 i X län)

Måttliga förekomster av **havrebladlus** konstaterades i tio av graderingsrutorna, med en lägre förekomst av **sädesbladlus** och **grönstrimmig gräsbladlus** (3 respektive 1 ruta). Bekämpningströskeln överskreds inte i något fall.

Kornets bladfläcksjuka noterades i sju av prognosrutorna, med en ökning av angreppsgraden i redan smittade fält. Störst angrepp hittades i Västmanlands och Stockholms län.

Graderade sorter var Annika, Fender, Laureate, RGT Planet, Skyway, SW Catriona, SW Makof och Tellus.

Skadegörare

Tabell 4. Antal vårkornfält efter skadegörare (% angripna blad 1–3). Medelvärden för denna och föregående vecka.

% ang blad 1–3	0	>0 – 15	>15 – 30	>30 – 60	>60 – 100	Medel 2025 v.25	Medel 2025 v.24
Kornets bladfläcksjuka	25	4	3	0	0	2	1

Tabell 5. Antal vårkornfält efter skadegörare (antal/strå). Medelvärden för denna och föregående vecka.

antal/strå	0	>0 – 3	>3 – 6	>6 – 12	>12	Medel 2025 v.25	Medel 2025 v.24
Havrebladlus	25	10	0	0	0	0	0.1
Sädesbladlus	32	3	0	0	0	0	0

Havre

DC 41 (21-53)

16 fält (3 i AB län, 4 i C län, 4 i U län, 4 i W län, 1 i X län)

Havrebladlus noterades i åtta av graderingsrutorna i Uppsala, Stockholms och Västmanlands län med ett snitt på 0,1 havrebladlöss/strå; en minskning sedan föregående vecka (0,7). Måttliga förekomster av **grönstrimmig gräsbladlus** hade också börjat noteras i Uppsala och Stockholms län. Bekämpningströskeln var inte uppnådd i något fält.

Angrepp av **bladfläcksvampar** konstaterades i 6 av 13 graderingsrutor i Uppsala, Stockholms, Västmanlands och Dalarnas län, med störst angrepp i Uppsala län (4 och 6 % av blad 1–3).

Skadegörare

Tabell 6. Antal havrefält efter skadegörare (% angripna plantor). Medelvärden för denna och föregående vecka.

% ang plantor	0	>0 – 15	>15 – 30	>30 – 60	>60 – 100	Medel 2025 v.25	Medel 2025 v.24
Primär angrepp	0	1	0	0	0	3	1.1

Tabell 7. Antal havrefält efter skadegörare (antal/strå). Medelvärden för denna och föregående vecka.

antal/strå	0	>0 – 3	>3 – 6	>6 – 12	>12	Medel 2025 v.25	Medel 2025 v.24
Havrebladlus	8	8	0	0	0	0.1	0.7

Ärter

Ärtbladlus påträffades i fyra av prognosrutorna i Stockholms och Uppsala län med ett snitt på 0,2 ärtbladlöss/planta. Fynden hade utökats till ett nytt fält jämfört med föregående vecka, men en snabb ökning av löss kunde inte observeras i de redan angripna fälten, och bekämpningströskeln var inte uppnådd i något fall. I de flesta fält låg knopparna fortfarande täckta av blad (DC 39).

De graderade sorterna var Ingrid och Bagoo.

Fältfördelning: 2 AB län, 11 C län och 2 U län.

Åkerböna

DC 59 (36–60). **Chokladfläcksjuka** påträffades i ett fält norr om Uppsala. Angreppet omfattade 28 % av plantorna i beståndet, som var i DC 51.

Fältfördelning: 4 C län och 1 U län.

Vårraps

DC 61 (61-61)

1 fält (1 i AB län, 0 i C län)

Utvecklingsmedianen för vårraps låg på DC 61, och fälten gick därmed i blom på de flesta håll. Vårrybsen i Dalarnas län befann sig i trebladsstadiet (DC 13), och inget angrepp av jordloppor påträffades i denna graderingsruta. Fälten är nu i de flesta fall behandlade med insektsmedel, och en naturlig utveckling av rapsbaggepopulationen kan därmed inte följas i graderingsrutorna.

Fältfördelning: 5 C län och 2 AB län.

Skadegörare

Tabell 8. Antal vårrapsfält efter skadegörare (antal/planta). Medelvärden för denna och föregående vecka.

antal/planta	0	>0 – 2	>2 – 4	>4 – 6	>6	Medel 2025 v.25	Medel 2025 v.24
Rapsbagge	0	1	0	0	0	0.2	0.6