

Veckorapport - Uppsala år 2025 vecka 26

Veckorapporten baseras på avläsningar av skadegörare i obehandlade rutor i Stockholms län (AB), Uppsala län (C), Västmanlands län (U), Dalarnas län (W) och Gävleborgs län (X). Angrepp av svampsjukdomar graderas på de tre översta bladen. Insektsgraderingar görs på 25 strån respektive 25 plantor.

Väder

Det har varit stor variation i mängden nederbörd med allt från 7,2 mm till 35 mm och stora skillnader även inom länen. Temperaturen har varit förhållandevis varm.

Höstvete	DC 69 (59-75)	51 fält (8 i AB län, 31 i C län, 9 i U län, 2 i W län, 1 i X län)
----------	---------------	---



Den snabba spridning av **gulrost** som noterats förra veckan hade nu stannat av, och utbredningen låg kvar på ca hälften av graderingsfälten, även om fyra nya fält tillkommit. Däremot hade angreppsgraden i redan smittade fält ökat i flera fall, med angrepp på över 50 % i fem av prognosrutorna i sorterna Norin, Kask, RGT Reform och KWS Ahoi. Störst angrepp påträffades i sorten Norin (94 %), DC 61. Drabbade sorter var Julius (4), Kask (10), KWS Ahoi (4), Norin (3), Praktik (1) och RGT Reform (3). Fynden gjordes i Stockholms län (4), Västmanlands län (4), Uppsala län (16) samt Dalarnas län (1).

Uppemot 94 % av prognosfälten var nu angripna av någon form av **bladfläcksvamp** på de tre översta bladen. I många fall var dock fläckarna fortfarande små. Denna ökning sedan föregående vecka bestod mestadels av en ökning av **vetets bladfläcksjuka**, då smittan nu stigit till högre bladnivåer i 6 nya fält. Angreppsgraden av vetets bladfläcksjuka hade också ökat, från 10,9 % till 17,5 %, medan angrepp av **svartpricksjuka** legat på en fortsatt låg nivå. Enstaka små angrepp av **brunfläcksjuka** och **brunrost** påträffades också. Brunrosten hittades i sorten Norin, DC 73.

Fynden av **bladlöss** hade varit fortsatt låg och sporadisk.

Skadegörare

Tabell 1. Antal höstvetefält efter skadegörare (% angripna blad 1–3). Medelvärden för denna och föregående vecka.

% ang blad 1–3	0	>0 – 15	>15 – 30	>30 – 60	>60 – 100	Medel 2025 v.26	Medel 2025 v.25
Mjöldagg	48	3	0	0	0	0.2	0.1
Svartpricksjuka	22	29	0	0	0	0.4	0.3
Vetets bladfläcksjuka	17	18	5	6	5	17	11
Brunrost	49	1	0	0	0	0	0
Gulrost	26	17	3	2	3	9.1	6.6

Vårvete	DC 45 (31-59)	12 fält (8 i C län, 2 i U län, 2 i W län)
---------	---------------	---



Gulrostfynden hade nu ökat till 5 av 12 fält, med ett medeltal på 2,7 % angreppsgrad. Angrepp över bekämpningströskeln förekom i tre prognosrutor. Det största angreppet (22 %) påträffades i Västmanlands län i sorten Diskett, DC 59. Övriga sorter som drabbats var Flippen (2) och KWS Pensum (2). Det hade också förekommit angrepp i fler sorter utanför graderingsverksamheten.

Vetets bladfläcksjuka hade ökat i redan angripna prognosrutor, och påträffades i ett par nya fält sedan föregående vecka. Det största angreppet (44 %) påträffades i Uppsala län i sorten Quarna, DC 43. Vete fanns som för- eller förförfrukt i samtliga angripna fält.

Mestadels måttliga förekomster av **bladlöss** noterades på vissa håll i Uppsala län, framförallt grönstrimmig gräsbladlus och havrebladlus. Ett angrepp av havrebladlus på 1,32 löss/strå noterades i DC 45.

Graderade sorter var Diskett, Flippen, Quarna, Sibelius och KWS Pensum.

Skadegörare

Tabell 2. Antal vårvetefält efter skadegörare (% angripna blad 1–3). Medelvärden för denna och föregående vecka.

% ang blad 1–3	0	>0 – 15	>15 – 30	>30 – 60	>60 – 100	Medel 2025 v.26	Medel 2025 v.25
Vetets bladfläcksjuka	6	5	0	1	0	6	1.3
Gulrost	7	4	1	0	0	2.7	0

Tabell 3. Antal vårvetefält efter skadegörare (antal/strå). Medelvärden för denna och föregående vecka.

antal/strå	0	>0 – 3	>3 – 6	>6 – 12	>12	Medel 2025 v.26	Medel 2025 v.25
Havrebladlus	10	2	0	0	0	0.1	0

Vårkorn	DC 51 (22-65)	35 fält (5 i AB län, 19 i C län, 5 i U län, 4 i W län, 2 i X län)
---------	---------------	---



Förekomsten av **havrebladlus** var mestadels fortsatt måttlig, med ett fall som tangerade bekämpningströskeln i en prognosruta i Uppsala län, DC 55. **Grönstrimmig gräsbladlus** påträffades i måttliga mängder, i en fjärdedel av prognosrutorna i Uppsala län. Förekomsten av **sädesbladlus** var fortsatt låg.

Nytt för denna vecka var fynd av **kornrost** i två prognosrutor i Västmanlands län, med angrepp på 2 % (DC 49) respektive 4 % (DC 61), i sorterna Laureate respektive Annika.

Ett par nya förekomster och en ökad angreppsgrad i vissa redan smittade fält kunde noteras för **kornets bladfläcksjuka**, med angrepp på 28 % och 44 % i två prognosrutor i Stockholms respektive Västmanlands län, DC 49 och 51. Sorterna var i detta fall SW Makof respektive RGT Planet.

I Dalarnas och Gävleborgs län var vårkornet fortfarande i bestockning och stråskjutning, och angreppsgraden lägre för samtliga skadegörare.

Graderade sorter var Annika, Fender, Laureate, RGT Planet, Skyway, SW Catriona, SW Makof och Tellus

Skadegörare

Tabell 4. Antal vårkornfält efter skadegörare (% angripna blad 1–3). Medelvärden för denna och föregående vecka.

% ang blad 1–3	0	>0 – 15	>15 – 30	>30 – 60	>60 – 100	Medel 2025 v.26	Medel 2025 v.25
Kornets bladfläcksjuka	22	9	2	1	0	2.8	2

Tabell 5. Antal vårkornfält efter skadegörare (antal/strå). Medelvärden för denna och föregående vecka.

antal/strå	0	>0 – 3	>3 – 6	>6 – 12	>12	Medel 2025 v.26	Medel 2025 v.25
Havrebladlus	24	11	0	0	0	0.2	0
Sädesbladlus	34	1	0	0	0	0	0

Havre	DC 49 (30-65)	16 fält (3 i AB län, 4 i C län, 4 i U län, 4 i W län, 1 i X län)
-------	---------------	--



Havrebladlus hittades i sex av graderingsrutorna, där den högsta angreppsgraden var 2,68 löss/huvudskott i ett fält i Västmanlands län, DC 45. Angreppet låg över tröskelvärdet för bekämpning (vid ett avräkningspris på 1,5 kr/kg). Skadenivån av **övriga bladlusarter** var måttlig.

Andelen prognosrutor angripna av **bladfläksvampar** var i stort sett oförändrad, med ett par nya förekomster sedan föregående vecka. Störst angrepp (8 %) påträffades i ett fält i Västmanlands län, DC 53. I tre av prognosfälten konstaterades **havrebakterios**.

Skadegörare

Tabell 6. Antal havrefält efter skadegörare (% angripna plantor). Medelvärden för denna och föregående vecka.

% ang plantor	0	>0 – 15	>15 – 30	>30 – 60	>60 – 100	Medel 2025 v.26	Medel 2025 v.25
Primär angrepp	0	0	0	0	0	-	3

Tabell 7. Antal havrefält efter skadegörare (antal/strå). Medelvärden för denna och föregående vecka.

antal/strå	0	>0 – 3	>3 – 6	>6 – 12	>12	Medel 2025 v.26	Medel 2025 v.25
Havrebladlus	10	6	0	0	0	0.2	0.1

Ärter	DC 63 (51-67)	16 fält (2 i AB län, 11 i C län, 3 i U län)
-------	---------------	---



En stor del av ärterna hade gått i blom. Antalet graderingsfält med **ärtbladlus** hade ökat från 4 till 14 av prognosrutorna sedan föregående vecka. Också medeltalet av ärtbladlus per planta hade ökat från 0,2 till 1,4 ärtbladlöss/planta, med ett fall över bekämpningströskeln i Uppsala län, DC 63, där 72 % av toppskotten var angripna. Ärtbladlöss konstaterades i samtliga län med prognosrutor, Stockholms, Uppsala och Västmanlands län. **Ärtvecklare** hade även anlänt till fälten.

De graderade sorterna var Ingrid och Bagoo.

Fältfördelning: 2 AB län, 11 C län och 3 U län.

Skadegörare

Tabell 8. Antal ärtfält efter skadegörare (antal/toppskott). Medelvärden för denna och föregående vecka.

antal/toppskott	0	>0 – 0	>0 – 5	>5 – 10	>10	Medel 2025 v.26	Medel 2025 v.25
Ärtbladlus	2	0	13	1	0	1.4	0.2

Åkerböna


DC 61 (59–67). **Chokladfläcksjuka** hittades i två av sex prognosrutor i Uppsala och Västmanlands län. Inga **bladlöss** påträffades i prognosrutorna.

Fältfördelning: 4 C län och 2 U län.