

Prognos och Varning

LERIK

Jordbruk

Linköping

< Gå tillbaka

Skriv ut

Veckorapport - Linköping år 2025 vecka 26

Veckorapporten baseras på avläsningar av skadegörare i obehandlade rutor i Södermanlands län (D), Östergötlands län (E) och Örebro län (T).

Insektsgraderingar görs på 25 plantor.

Sista graderingen av höstkorn

Antal höstvetefält sorterade efter *nederbörd (mm)* samt medelvärden för denna och föregående vecka.

0	>0 – 5	>5 – 10	>10 – 20	>20	Medel 2025 v.26	Medel 2025 v.25
0	20	16	9	3	8.4	8

HöstveteDC 73 (65-77)49 fält (14 i T län, 9 i D län, 26 i E län)

De flesta fält är i mjölmognad. Angrepp av mjöldagg förekommer i ca en tredjedel av fälten men har inte ökat i omfattning sedan förra veckan. Som mest 56 procent angripna blad. Svartpricksjuka ökar långsamt och är uppe på 4 % angripna blad i genomsnitt. Som mest förekommer 18 procent angripna blad i ett Etana fält. Även vetets bladfläcksjuka ökar långsamt och är uppe på 10 % angripna blad i genomsnitt. Det förekommer enstaka fält med mycket starka angrepp. Brunrost ökar också långsamt. Vi har hittat brunrost i tre av varningsfälten. Även gulrost ökar svagt. Fem av varningsfälten har angrepp på över 60 % angripna blad. Gräsbladlöss och sädesbladlöss förekommer i drygt en tredjedel av varningsfälten i nivåer upp till 0,7 löss/strå.

Skadegörare

Tabell 1. Antal höstvetefält efter skadegörare (% angripna blad 1–3). Medelvärden för denna och föregående vecka.

% ang blad 1–3	0	>0 – 15	>15 – 30	>30 – 60	>60 – 100	Medel 2025 v.26	Medel 2025 v.25
Mjöldagg	33	9	3	4	0	6	6.1
Svartpricksjuka	14	30	5	0	0	4.1	1.8
Vetets bladfläcksjuka	10	29	6	2	2	10	6.6
Bladfläcksvampar	4	27	13	3	2	14	8
Brunrost	46	2	1	0	0	0.9	0.1
Gulrost	24	10	5	5	5	16	13

RågDC 77 (69-83)7 fält (1 i T län, 1 i D län, 5 i E län)

Även huvuddelen av rågfälten är i mjölmognad. Mjöldaggsangreppen ligger still på en låg nivå. Angreppen av sköldfläcksjuka ökar svagt till ett genomsnittligt angrepp på 11 % angripna blad. Brunrosten har ökat mer och förekommer nu i flertalet fält i nivåer upp till 80 % angripna blad. Enstaka bladlöss förekommer i något fält.

Skadegörare

Tabell 2. Antal rågfält efter skadegörare (% angripna blad 1–3). Medelvärden för denna och föregående vecka.

% ang blad 1–3	0	>0 – 15	>15 – 30	>30 – 60	>60 – 100	Medel 2025 v.26	Medel 2025 v.25
Mjöldagg	4	3	0	0	0	2.3	4.9
Sköldfläcksjuka	0	6	0	1	0	11	8.9

Brunrost	2	2	1	0	2	27	11
----------	---	---	---	---	---	----	----

Rågvete

DC 71 (69-75)

6 fält (4 i T län, 2 i E län)

De flesta fält är i mjölmognad. Mjöldagg förekommer i alla fält och ökar långsamt. Ingen ökning av angreppen av sköldfläcksjuka och bladfläcksvampar. Inte heller angreppen av gulrost har ökat mer än marginellt i de fåtal varningsfält som är angripna. Tripsangrepp noterat i ett av fem varningsfält.

Skadegörare

Tabell 3. Antal rågvetefält efter skadegörare (% angripna blad 1–3). Medelvärden för denna och föregående vecka.

% ang blad 1–3	0	>0 – 15	>15 – 30	>30 – 60	>60 – 100	Medel 2025 v.26	Medel 2025 v.25
Mjöldagg	0	2	0	3	1	46	40
Bladfläcksvampar	4	2	0	0	0	2.7	1.7
Sköldfläcksjuka	4	1	1	0	0	4.3	5
Brunrost	6	0	0	0	0	0	0
Gulrost	4	2	0	0	0	2.7	2

Höstkorn

DC 85 (85-85)

4 fält (2 i T län, 2 i E län)

Sista graderingen i höstkorn. Grödan är i mitten av degmognad. Mjöldaggsangreppet har ökat och ligger på 38 procent angripna blad i genomsnitt. Angreppet av kornets bladfläcksjuka har däremot stagnerat på 14 procent angripna blad. Även sköldfläcksjuka har stannat på låga 2 procent angripna blad. Kornrost har däremot ökat från 6 till 20 procent angripna blad. Ökningen kommer framförallt från två fält i Örebro län. Även Ramularia har dykt upp i ett par varningsfält och utvecklas snabbt. I ett fält är 92 procent av bladen angripna.

Skadegörare

Tabell 4. Antal höstkornfält efter skadegörare (% angripna blad 1–3). Medelvärden för denna och föregående vecka.

% ang blad 1–3	0	>0 – 15	>15 – 30	>30 – 60	>60 – 100	Medel 2025 v.26	Medel 2025 v.25
Mjöldagg	1	0	1	1	1	38	25
Kornets bladfläcksjuka	0	2	2	0	0	14	16
Sköldfläcksjuka	3	1	0	0	0	2.5	2.5
Kornrost	1	1	1	1	0	20	6
Ramularia	2	1	0	0	1	26	0

Vårvete

DC 55 (39-65)

8 fält (6 i T län, 2 i D län)

Majoriteten av vårvetefälten är i axgång men variationen är fortfarande mycket stor. Angreppet av mjöldagg fortsätter att öka och har fördubblats under veckan till 15 procent angripna blad i genomsnitt. Vetets bladfläcksjuka ökar också men från en mycket låg nivå. Däremot syns fortfarande inga symtom av svartpricksjuka. Gulrosten har ökat kraftigt och förekommer i hälften av varningsfälten i nivåer upp till 32 procent angripna blad. Framförallt är det sorten Flippen som är angripen. Ingen brunrost noterad. Bladlöss förekommer i flertalet fält och ett fält i Örebro län ligger över bekämpningströsklen denna vecka.

Skadegörare

Tabell 5. Antal vårvetefält efter skadegörare (% angripna blad 1–3). Medelvärden för denna och föregående vecka.

% ang blad 1–3	0	>0 – 15	>15 – 30	>30 – 60	>60 – 100	Medel 2025 v.26	Medel 2025 v.25
Mjöldagg	3	2	0	3	0	15	7.5
Svartpricksjuka	6	2	0	0	0	0	0

Vetets bladfläcksjuka	3	5	0	0	0	2.8	0.5
Bladfläcksvampar	3	5	0	0	0	2.8	0.5
Brunrost	8	0	0	0	0	0	0
Gulrost	4	3	0	1	0	7	0.5

Tabell 6. Antal vårvetefält efter skadegörare (antal/strå). Medelvärden för denna och föregående vecka.

antal/strå	0	>0 – 15	>15 – 30	>30 – 60	>60 – 100	Medel 2025 v.26	Medel 2025 v.25
Sädesbladlus	7	1	0	0	0	0	0

Tabell 7. Antal vårvetefält efter skadegörare (antal/strå). Medelvärden för denna och föregående vecka.

antal/strå	0	>0 – 3	>3 – 6	>6 – 12	>12	Medel 2025 v.26	Medel 2025 v.25
Havrebladlus	2	6	0	0	0	0.6	0.7

Vårkorn

DC 69 (53-77)

26 fält (7 i T län, 9 i D län, 10 i E län)

Vårkornet är i slutet av blomning och många fält är inne i mjölmognad. Generellt svaga angrepp av svamp och liten ökning under senaste veckan. Kornets bladfläcksjuka är mest frekvent och förekommer i ca 40 procent av varningsfälten. Bladlöss förekommer i många fält framförallt i Örebro och Södermanlands län. Havrebladlöss är vanligast. Ett fält i Örebro län överskrider bekämpningströskeln denna vecka.

Skadegörare

Tabell 8. Antal vårkornfält efter skadegörare (% angripna blad 1–3). Medelvärden för denna och föregående vecka.

% ang blad 1–3	0	>0 – 15	>15 – 30	>30 – 60	>60 – 100	Medel 2025 v.26	Medel 2025 v.25
Mjöldagg	24	1	0	1	0	2.3	1
Kornets bladfläcksjuka	15	9	1	1	0	3.4	1.4
Sköldfläcksjuka	25	1	0	0	0	0.1	0
Ramularia	23	2	0	0	0	0.1	0
Kornrost	24	2	0	0	0	0.1	0.1

Tabell 9. Antal vårkornfält efter skadegörare (antal/strå). Medelvärden för denna och föregående vecka.

antal/strå	0	>0 – 3	>3 – 6	>6 – 12	>12	Medel 2025 v.26	Medel 2025 v.25
Havrebladlus	16	10	0	0	0	0.2	0.2
Sädesbladlus	22	4	0	0	0	0	0

Havre

DC 59 (51-65)

16 fält (8 i T län, 2 i D län, 6 i E län)

De flesta fält är i sen vippgång. Överlag är det fortfarande svaga svampangrepp. Havrens bladfläcksjuka förekommer med svaga angrepp i fem av varningsfälten. Första noteringen av kronrost i ett fält i Södermanland. Bladlöss, främst havrebladlöss förekommer i flertalet fält och tre av fälten överskrider bekämpningströskeln denna veckan.

Skadegörare

Tabell 10. Antal havrefält efter skadegörare (% angripna blad 1–3). Medelvärden för denna och föregående vecka.

% ang blad 1–3	0	>0 – 15	>15 – 30	>30 – 60	>60 – 100	Medel 2025 v.26	Medel 2025 v.25
Mjöldagg	15	1	0	0	0	0.1	0
Bladfläcksvampar	11	5	0	0	0	1.3	0.1
Kronrost	15	1	0	0	0	0	0
Bladbakterios	11	5	0	0	0	0.5	0.6

Tabell 11. Antal havrefält efter skadegörare (antal/strå). Medelvärden för denna och föregående vecka.

antal/strå	0	>0 – 3	>3 – 6	>6 – 12	>12	Medel 2025 v.26	Medel 2025 v.25
Havrebladlus	5	10	1	0	0	0.7	0.5
Sädesbladlus	15	1	0	0	0	0	0

Ärter

DC 65 (61-74)

13 fält (3 i T län, 5 i D län, 5 i E län)

Ärtfälten är i blomning. Ärtbladlössen ökar och förekommer i flertalet fält upp till 7 löss/toppskott. Ca 25 procent av varningsfälten överskrider bekämpningströskeln.

Skadegörare

Tabell 12. Antal ärtfält efter skadegörare (antal/toppskott). Medelvärden för denna och föregående vecka.

antal/toppskott	0	>0 – 0	>0 – 5	>5 – 10	>10	Medel 2025 v.26	Medel 2025 v.25
Ärtbladlus	1	0	9	3	0	2.6	0.3

Åkerböna

DC 65 (65-67)

6 fält (1 i T län, 1 i D län, 4 i E län)

Full blom. Svampangreppen ligger på samma nivå som förra veckan. Bönbladlöss förekommer i hälften av varningsfälten men har inte ökat sedan förra veckan.

Skadegörare

Tabell 13. Antal åkerbönsfält efter skadegörare (% angripna plantor). Medelvärden för denna och föregående vecka.

% ang plantor	0	>0 – 15	>15 – 30	>30 – 60	>60 – 100	Medel 2025 v.26	Medel 2025 v.25
Chokladfläcksjuka	4	1	0	0	1	15	15
Bladmögel	5	1	0	0	0	0.7	0.7
Bönfläcksjuka	5	1	0	0	0	0	0
Bönrost	6	0	0	0	0	0	0
Bönbladlus	3	3	0	0	0	2	2.7

Potatis

DC 24 (22-51)

4 fält (4 i E län)

Blasttillväxten ökar snabbt i potatisen. Inflygning av stritar till fälten har minskat sedan förra veckan. Fortsatt låg till måttlig risk för potatisbladmögel.

Fällfångster

Tabell 15. Antal fällfångster. Medelvärden för denna och föregående vecka.

Antal/referensyta/dygn	0 – 1	>1 – 10	>10 – 50	>50 – 100	>100	Medel 2025 v.26	Medel 2025 v.25
Stritar	0	4	0	0	0	4.7	16