

## Veckorapport - Linköping vecka 21

Veckorapporten baseras på avläsningar av skadegörare i obehandlade rutor i Södermanlands län (D), Östergötlands län (E) och Örebro län (T). Angrepp av svampsjukdomar graderas på de tre översta bladen. Insektsgraderingar görs på 25 strån respektive 25 plantor.

Gulskålar för fångst av insekter är placerade i höstrapsfält i Södermanland, Östergötland och Örebro. Skålarna töms och undersöks en gång i veckan.

### Vädret

Vädret har fortsatt varit växlande. Vissa dagar med solsken men också dagar med rikligt med regn, åskskurar och även hagel på sina håll. Lokala åskskurar har gett cirka 40 mm under veckan på några platser i Östergötland. Samtidigt som det vid Sörmlandskusten endast kommit 2-3 mm. I genomsnitt har det regnat 16 mm i de 54 regnmätarna som vi har utplacerade i regionen.

Tabell 1. Antal höstvetefält sorterade efter nederbörd (mm) samt medelvärden för denna och föregående vecka.

mm	0	0 – 5	5 – 10	10 – 20	20 –	Medel v.21	Medel v.20
Nederbörd	0	5	11	23	15	<b>16</b>	21

### Höstvete

#### DC 32 (31-37)

#### 61 fält

Höstvete befinner sig i stråskjutning. I enstaka fält börjar flaggbladet växa fram. Angreppen ser ut att minska under stråskjutningen när det växer ut nya blad. Vetets bladfläcksjuka har ökat trots detta. I några riskfält med vete som förfrukt och ej plöjt finns det även bladfläckar på de övre bladnivåerna. Utvecklingen av svartpricksjuka går långsamt i den svala väderleken. Gulrost noterad i fem fält varav två fält med sorten Norin övriga sorter var Memory, Ahoj, och Kalmar.

Tabell 2. Antal höstvetefält efter skadegörare (% angripna blad 1–3). Medelvärden för denna och föregående vecka.

% ang blad 1–3	0	0 – 15	15 – 30	30 – 60	60 – 100	Medel v.21	Medel v.20
Mjöldagg	45	16	0	0	0	<b>1.0</b>	1.3
Svartpricksjuka	30	31	0	0	0	<b>1.5</b>	4.7
Vetets bladfläcksjuka	28	26	4	3	0	<b>5</b>	2.0
Bladfläcksvampar	14	40	4	3	0	<b>7</b>	7
Brunrost	61	0	0	0	0	<b>0.0</b>	0.0
Gulrost	56	4	1	0	0	<b>0.7</b>	0.0

## Råg DC 47 (43-57) 10 fält

De flesta rågfälten närmar sig axgång och en del håller redan på att gå i ax. Brunrost noterat i tre fält. Ett fält i västra Östergötland med 20 % av bladen angripna av sköldfläcksjuka. För övrigt endast låga förekomster av mjöldagg och brunrost. Förekomsten av trips är lägre än normalt som mest 0,5 trips/strå, i medeltal 0,1 trips/strå.

**Tabell 3.** Antal rågfält efter skadegörare (% angripna blad 1–3). Medelvärden för denna och föregående vecka.

% ang blad 1–3	0	0 – 15	15 – 30	30 – 60	60 – 100	Medel v.21	Medel v.20
Mjöldagg	6	4	0	0	0	<b>1.0</b>	1.2
Sköldfläcksjuka	2	7	1	0	0	<b>3.8</b>	1.8
Brunrost	7	3	0	0	0	<b>1.8</b>	0.2

## Rågvete DC 37 (32-39) 9 fält

Flaggbladet håller på att växa fram i de flesta fälten. Mjöldagg på blad tre i några fält. Gulrost noterat i ett fält, som tidigare, i Södermanland med sorten Cappricia.

**Tabell 4.** Antal rågvetefält efter skadegörare (% angripna blad 1–3). Medelvärden för denna och föregående vecka.

% ang blad 1–3	0	0 – 15	15 – 30	30 – 60	60 – 100	Medel v.21	Medel v.20
Brunrost	9	0	0	0	0	<b>0.0</b>	0.0
Bladfläcksvampar	7	2	0	0	0	<b>0.2</b>	1.1
Sköldfläcksjuka	6	3	0	0	0	<b>1.6</b>	0.2
Mjöldagg	3	4	2	0	0	<b>8</b>	12
Gulrost	8	1	0	0	0	<b>1.1</b>	1.1

## Höstkorn DC 43 (32-49) 11 fält

Höstkornet närmar sig axgång. Sköldfläcksjuka med cirka 20 % angripna blad, i två fält i Östergötland. Övriga svampsjukdomar i måttliga mängder ännu så länge.

**Tabell 5.** Antal höstkornfält efter skadegörare (% angripna blad 1–3). Medelvärden för denna och föregående vecka.

% ang blad 1–3	0	0 – 15	15 – 30	30 – 60	60 – 100	Medel v.21	Medel v.20
Mjöldagg	5	6	0	0	0	<b>2.4</b>	4.2
Kornets bladfläcksjuka	8	3	0	0	0	<b>0.9</b>	0.9
Sköldfläcksjuka	5	4	2	0	0	<b>4.7</b>	1.8
Ramularia	11	0	0	0	0	<b>0.0</b>	0.0
Kornrost	6	5	0	0	0	<b>3.1</b>	2.7

**Höstoljeväxter** **DC 65 (65-67)** **10 fält**

Höstrapsen är i full blom. Fångsterna av både fyrtandade rapsvivar och blåvingade rapsvivar ligger på låga nivåer. Betydelsen av de stjälkskador som de blåvingade- och fyrtandade rapsvivelarna gör är oftast av liten betydelse. De första blygrå rapsvivelarna fångades förra veckan, denna vecka har det fångats blygrå rapsvivar i måttliga mängder.

**Vårvete** **DC 12 (11-22)** **10 fält**

Ett riskfält med vete som förfrukt i två år och oplöjt, har ett etablerat angrepp av vetets bladfläcksjuka. I övrigt inga sjukdomar noterade.

**Vårkorn** **DC 20 (11-31)** **30 fält**

Inga eller obetydliga primärangrepp av kornets bladfläcksjuka.

**Havre** **DC 13 (11-30)** **19 fält**

Inga sjukdomar eller insekter noterade.

**Ärter och åkerböna** **DC 12 (11-33)** **10 fält**

Gnag av ärtvivel i de flesta fält men endast på den yttre bladskivan.

**Lin** **DC 2 (2-3)** **6 fält**

Linjordloppan har missgynnats av den fuktiga väderleken. Även om det finns gnagskador på de flesta plantorna så är det i samtliga graderade fält obetydliga skador.

**Växtskyddcentralen Linköping**



Europeiska jordbruksfonden för  
landsbygdsutveckling: Europa  
investerar i landsbygdsområden