

# STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING

## Skördeprognos för spannmål och oljeväxter

**Ämnesområde**

Jord- och skogsbruk, fiske

**Statistikområde**

Jordbrukets produktion

**Produktkod**

JO0605

**Referenstid**

2022

**Kontaktuppgifter**

<b>Statistikansvarig myndighet</b>	Statens jordbruksverk
<b>Kontaktinformation</b>	Statistikproducent: Simon Lind
<b>E-post</b>	simon.lind@jordbruksverket.se
<b>Telefon</b>	036 - 16 63 42

## Innehåll

1	Statistikproduktens sammanhang.....	3
2	Undersökningsdesign .....	3
2.1	Målstorheter .....	3
2.2	Ramförfarande .....	3
2.3	Förfaranden för urval och uteslutning .....	3
2.3.1	Urvalsförfarande.....	3
2.3.2	Uteslutning från insamling (cut-off) .....	3
2.4	Insamlingsförfarande.....	3
2.4.1	Datainsamlingsmetoder .....	3
2.4.2	Mätning.....	4
2.4.3	Bortfallsuppföljning .....	4
2.5	Bearbetningar.....	4
2.6	Granskning.....	5
2.6.1	Granskning under insamlingen .....	5
2.6.2	Granskning av mikrodata .....	5
2.6.3	Granskning av makrodata.....	5
2.6.4	Granskning av redovisning .....	5
2.7	Skattningsförfarande .....	5
2.7.1	Principer och antaganden .....	5
2.7.2	Skattningsförfarande för målstorheter.....	6
2.7.3	Skattningsförfarande för tillförlitlighet.....	13
2.7.4	Röjandekontroll .....	13
3	Genomförande .....	13
3.1	Kvantitativ information .....	14
3.2	Avvikelser från undersökningsdesignen .....	14

## **1 Statistikens sammanhang**

I detta dokument beskrivs framtagningen av den årliga skördeprognosen för spannmål och oljeväxter. Statistikens kvalitet redovisas i kvalitetsdeklarationen som publiceras tillsammans med statistikrapporten och finns tillgängligt på Jordbruksverkets och SCB:s webbplatser.

Undersökningen syftar till att ta fram en prognos för hur stor årets skörd av spannmål och oljeväxter förväntas bli i Sverige. Det finns ett stort intresse från branschen och media för denna prognos då det finns ett behov av skördeinformation innan de preliminära och slutliga uppskattningarna är klara.

I november redovisas preliminära skörderesultat på riksnivå (produkt JO0601) och i december på länsnivå (produkt JO0601). De slutliga skördeuppskattningarna publiceras våren nästkommande år (produkt JO0601).

## **2 Undersökningsdesign**

### **2.1 Målstorheter**

I skördeprognosen redovisas total- och hektarskördar för spannmål och oljeväxter.

### **2.2 Ramförfarande**

Skördeprognosen baseras på tidigare års skördar samt väderdata vilket gör att ramförfarande inte är aktuellt.

### **2.3 Förfaranden för urval och uteslutning**

#### **2.3.1 Urvalsförfarande**

För uppgifter om skörd och arealer är urvalsförfarande ej tillämpligt. De uppgifterna hämtas ifrån befintliga uppgifter om skörd och arealer.

Uppgifter för temperatur och nederbörd hämtas från en väderstation per län (se bilaga A). Urvalet av väderstationer har gjorts från områden med åkermark i länen.

#### **2.3.2 Uteslutning från insamling (cut-off)**

Det är inte aktuellt.

### **2.4 Insamlingsförfarande**

#### **2.4.1 Datainsamlingsmetoder**

Uppgifter om sådda arealer hämtas ifrån IAKS, det vill säga alla arealer som jordbruksföretagen har sökt stöd för. Arealerna är preliminära och kan justeras efter ändringar i stödansökningarna av

jordbruksföretagen själva samt efter kontroller av Jordbruksverket. Slutliga arealer för de företag som ingår i Lantbruksregistret 2021 presenteras i undersökningen *Jordbruksmarkens användning* (produkt JO0104) under hösten.

Uppgifter från föregående års skördar hämtas ifrån undersökningen *Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter* (produkt JO0601) .

Väderdata hämtas ifrån SMHI:s webbplats och består av månadsvärden för dygnsmedeltemperatur och månadernas totala nederbörd uppdelat på 63 väderstationer, en station per län.

#### **2.4.2 Mätning**

Se dokumentation för respektive undersökning ovan, som ligger till grund för prognosen.

#### **2.4.3 Bortfallsuppföljning**

Det görs ingen bortfallsuppföljning.

### **2.5 Bearbetningar**

Det ingår nio spannmålsgrödor och fyra oljeväxter i prognosen.

<u>Spannmål</u>	<u>Oljeväxter</u>
Höstvete	Höstraps
Vårvete	Vårraps
Höstråg	Höstrybs
Höstkorn	Vårrybs
Vårkorn	
Havre	
Höstrågvete	
Vårrågvete	
Blandsäd	

För de län där dessa grödor odlas i sådan omfattning att det finns ett definitivt skörderesultat, finns också hektarskördar för många år tillbaka. Dessa tas fram med hjälp av regressionsmodeller som estimerar förväntad hektarskörd för enskilda grödor länsvis utifrån tidigare skördar och väder samt en trendvariabel. Med hjälp av denna modell går det, genom att stoppa in årets väderdata, få fram en uppskattad hektarskörd för aktuellt år för varje län och gröda. Trendvariabeln har som funktion att representera den systematiska ökning som sker för hektarskördarna över tid. Det värde som används som konstant i trendvariabeln är lika med det aktuella året prognosen avser. Den ökar alltså konstant med ett över tiden. I bilaga

B och C redovisas vilka förklaringsvariabler som är med för varje höstgröda och vårgröda i respektive län för prognosen 2021.

## **2.6 Granskning**

### **2.6.1 Granskning under insamlingen**

Uppgifter för temperatur och nederbörd kontrolleras så att siffrorna verkar vara i nivå med tidigare års värden. Skiljer något värde mycket så kontrolleras uppgiften med SMHI.

### **2.6.2 Granskning av mikrodata**

Resultat för arealer, hektarskördar och totalskördar jämförs med tidigare år för att se att uppgifterna ligger inom rimliga nivåer.

### **2.6.3 Granskning av makrodata**

Efter att prognosen är framtagen jämförs resultatet med tidigare prognoser och slutliga skördar. Resultat för arealer, hektarskördar och totalskördar jämförs med tidigare år för att se att uppgifterna ligger inom rimliga nivåer.

### **2.6.4 Granskning av redovisning**

Jordbruksverket följer en produktionsprocess för framställning av officiell statistik. I denna process ingår två typer av granskning inför publicering.

Dels genomförs en omfattande korrekturläsning som granskar om data och beräkningar som presenteras i text, tabblåer och figurer stämmer överens med det data som presenteras i tabellerna. I korrekturläsningen kontrolleras även att publikationen följer den fastlagda mallen för våra publikationer och att språket är lättläst och korrekt.

Utöver korrekturläsningen går en granskningsgrupp (bestående av ett antal medarbetare vid Jordbruksverkets statistikenhet) igenom publikationen och dess medföljande material med avseende på resultatens rimlighet, publikationens struktur, vad som lyfts fram i text och rubriker samt om presentationen är lättillgänglig för användarna.

## **2.7 Skattningsförfarande**

### **2.7.1 Principer och antaganden**

För prognosen görs det regressionsmodeller för alla grödor som odlas i sådan omfattning att det finns ett definitivt skörderesultat på länsnivå att tillgå för många år tillbaka. Hektarskördarna mäts i enheten kg/ha där inget annat anges. Tillsammans med tidigare års väderdata samt en trendvariabel används denna information för att

skapa linjära regressionsmodeller. En linjär regressionsmodell tas fram med hjälp av bakåteliminering. Vid bakåteliminering startar man med så kallad full modell, vilket i vårt fall skulle se ut så här:

Regressionsmodellen ges av sambandet:

$$y_{ij} = K + t_0 b_0 + x_1 b_1 + x_2 b_2 + \dots + x_{10} b_{10} + z_1 b_{11} + z_2 b_{12} + \dots + z_{10} b_{20}$$

där  $i$  står för gröda  $i =$  Höstvet, vårvet, ....., vårrybs

och  $j$  står för län  $j =$  Stockholms län, Uppsala län, ....., Norrbottens län.

Där:

$y_{ij}$  = skattade hektarskörden för gröda  $i$  i län  $j$

$K$  = konstant

$t_0$  = trendvariabel

$x_1 - x_{10}$  = månadsmedelvärden för dygnsmedeltemperaturen där  $x_1 =$  jan,  $x_2 =$  feb, ...,  $x_{10} =$  okt.

$z_1 - z_{10}$  = total månadsnederbörd (mm) där  $z_1 =$  jan,  $z_2 =$  feb, ...,  $z_{10} =$  okt.

$b_0 - b_{20}$  = regressionskoefficienter

I modellen sätts värdet för augusti-oktober innevarande år till genomsnittet för de 30 senaste åren. Modellen förutsätter att nederbörden och temperaturen under denna tid förväntas vara normala.


### 2.7.2 Skattningsförfarande för målstorheter

Då inte alla grödor i alla län odlas i den omfattningen så att vi kan redovisa några hektarskördar med de definitiva skörderesultaten så får vi skatta vissa grödors hektaravkastning i vissa län för denna prognos. Även för grödor i vissa län där det redovisas hektarskördar nu men inte har redovisats tillräckligt många år skattas hektaravkastning. Vårkorn är den enda gröda som vi har definitiva hektarskördar för samtliga län.

För län som inte har prognostiserad hektaravkastning för en gröda men att det finns för den grödan i andra län skattas hektarskörden i län utan prognostiserad hektaravkastning med hjälp av prognostiserad hektarskörd i intilliggande län samt annan gröda. Har vi inte någon prognostiserad hektarskörd alls för en gröda används gröda med liknande avkastningsmönster som hjälpvariabel vid skattingarna.

Tidigare analyser har påvisat vilka grödor som gentemot varandra uppvisar liknande avkastningsmönster. De grödor som vi ej har några prognostiserade hektarskörden för är höstkorn, blandsäd, höstrågvete, vårrågvete och höstrybs.

Hektaravkastningar för grödor som skattas med hjälp av prognostiserad hektaravkastning för vårkorn i samma län samt intilliggande läns avkastningsmönster för samma gröda och vårkorn, beräknas först. Efter det beräknas hektaravkastning för grödor som skattas med hjälp av hektaravkastning för höstvetete eller havre i samma län samt intilliggande läns avkastningsmönster för samma gröda och höstvetete respektive havre. Till sist beräknas hektaravkastningarna för de grödor som skattas helt m.h.a. andra grödor. Beräkningarna måste ske i denna ordning eftersom de första beräkningarna ligger till grund för de nästkommande. Sist i detta avsnitt finns en skiss som överskådligt visar vilka grödors avkastningsmönster som används vid skattningen av annan gröda.



Nedan kommer en beskrivning av skattningen för varje gröda:

### Höstvetete

Beräknas i första steget. Följande formel används för att beräkna hektarskörden för höstvetete:

$$\frac{x_i}{y_i} * z_j = t_j$$

där  $j$  står för det län som ska skattas och  $i$  för intilliggande län i förhållande till län  $j$ .

$i, j$  = Stockholms län, Uppsala län, ..., Norrbottens län

$x_i$  = prognostiserade hektarskörden för höstvetete i län  $i$

$y_i$  = prognostiserade hektarskörd för vårkorn i län  $i$

$z_j$  = prognostiserade hektarskörd för vårkorn för län  $j$

$t_j$  = skattad hektarskörd för län  $j$

### Vårvete

Beräknas i första steget. Följande formel används för att beräkna hektarskörden för vårvete:

$$\frac{x_i}{y_i} * z_j = t_j$$

där  $j$  står för det län som ska skattas och  $i$  för intilliggande län i förhållande till län  $j$ .

$i, j$  = Stockholms län, Uppsala län, ..., Norrbottens län

$x_i$  = prognostiserade hektarskörden för vårvete i län  $i$

$y_i$  = prognostiserade hektarskörd för vårkorn i län  $i$

$z_j$  = prognostiserade hektarskörd för vårkorn för län  $j$

$t_j$  = skattad hektarskörd för län  $j$

### Höstråg

Beräknas i andra steget. Följande formel används för att beräkna hektarskörden för höstråg:

$$\frac{x_i}{y_i} * z_j = t_j$$

där  $j$  står för det län som ska skattas och  $i$  för intilliggande län i förhållande till län  $j$ .

$i, j$  = Stockholms län, Uppsala län, ..., Norrbottens län

$x_i$  = prognostiserade hektarskörden för höstråg i län  $i$

$y_i$  = prognostiserade hektarskörd för höstvetete i län  $i$



$z_j$  = prognostiserade hektarskörd för höstvetete för län  $j$

$t_j$  = skattad hektarskörd för län  $j$

### Höstkorn

Beräknas i steg tre. Skattas helt med hjälp av andra grödors avkastningsmönster. Följande formel används för att beräkna hektarskörden för höstkorn:

$$w_j * 0,6 + q_j * 0,4 = t_j$$

$j$  = Stockholms län, Uppsala län, ..., Norrbottens län

$w_j$  = prognostiserade hektarskörden för höstvetete i län  $j$

$q_j$  = prognostiserade hektarskörd för vårkorn för län  $j$

$t_j$  = skattad hektarskörd för län  $j$

### Havre

Beräknas i första steget. Följande formel används för att beräkna hektarskörden för havre:

$$\frac{x_i}{y_i} * z_j = t_j$$

där  $j$  står för det län som ska skattas och  $i$  för intilliggande län i förhållande till län  $j$ .

$i, j$  = Stockholms län, Uppsala län, ..., Norrbottens län

$x_i$  = prognostiserade hektarskörden för havre i län  $i$

$y_i$  = prognostiserade hektarskörd för vårkorn i län  $i$

$z_j$  = prognostiserade hektarskörd för vårkorn för län  $j$

$t_j$  = skattad hektarskörd för län  $j$

### Blandsäd

Beräknas i steg tre. Skattas helt m.h.a. andra grödors avkastningsmönster. Följande formel används för att beräkna hektarskörden för blandsäd:

$$\frac{w_j + q_j + u_j}{3} * 0,8 = t_j$$

$j$  = Stockholms län, Uppsala län, ..., Norrbottens län

$w_j$  = prognostiserade hektarskörden för vårvete i län  $j$

$q_j$  = prognostiserade hektarskörd för vårkorn för län  $j$

$u_j$  = prognostiserade hektarskörd för havre för län  $j$

$t_j$  = skattad hektarskörd för län  $j$

### Höstrågvete

Beräknas i steg tre. Skattas helt m.h.a. andra grödors avkastningsmönster. Följande formel används för att beräkna hektarskörden för höstrågvete:

$$\text{Maxbeloppet av } (w_j \text{ eller } q_j) = t_j$$

$j$  = Stockholms län, Uppsala län, ..., Norrbottens län

$w_j$  = prognostiserade hektarskörden för vårvete i län  $j$

$q_j$  = prognostiserade hektarskörd för höstråg för län  $j$

$t_j$  = skattad hektarskörd för län  $j$

### Vårrågvete

Beräknas i steg tre. Skattas helt m.h.a. annan grödas avkastningsmönster. Följande formel används för att beräkna hektarskörden för höstrågvete:

$$w_j * 0,7 = t_j$$

$j$  = Stockholms län, Uppsala län, ..., Norrbottens län

$w_j$  = prognostiserade hektarskörden för vårkorn i län  $j$

$t_j$  = skattad hektarskörd för län  $j$

### Höstraps

Beräknas i andra steget. Följande formel används för att beräkna hektarskörden för höstraps:

$$\frac{x_i}{y_i} * z_j = t_j$$

där  $j$  står för det län som ska skattas och  $i$  för intilliggande län i förhållande till län  $j$ .

$i, j$  = Stockholms län, Uppsala län, ..., Norrbottens län

$x_i$  = prognostiserade hektarskörden för höstraps i län  $i$

$y_i$  = prognostiserade hektarskörd för höstvetete i län  $i$

$z_j$  = prognostiserade hektarskörd för höstvetete för län  $j$

$t_j$  = skattad hektarskörd för län  $j$

### Vårraps

Beräknas i andra steget. Följande formel används för att beräkna hektarskörden för vårraps:

$$\frac{x_i}{y_i} * z_j = t_j$$

där  $j$  står för det län som ska skattas och  $i$  för intilliggande län i förhållande till län  $j$ .

$i, j$  = Stockholms län, Uppsala län, ..., Norrbottens län

$x_i$  = prognostiserade hektarskörden för vårraps i län  $i$

$y_i$  = prognostiserade hektarskörd för havre i län  $i$

$z_j$  = prognostiserade hektarskörd för havre för län  $j$

$t_j$  = skattad hektarskörd för län  $j$

### Höstrybs

Beräknas i steg tre. Skattas helt m.h.a. andra grödors avkastningsmönster. Följande formel används för att beräkna hektarskörden för höstrybs:

$$w_j * 0,75 + q_j * 0,25 = t_j$$

$j$  = Stockholms län, Uppsala län, ..., Norrbottens län

$w_j$  = prognostiserade hektarskörden för vårrybs i län  $j$

$q_j$  = prognostiserade hektarskörd för höstraps för län  $j$

$t_j$  = skattad hektarskörd för län  $j$

### Vårrybs

Beräknas i andra steget. Följande formel används för att beräkna hektarskörden för vårrybs:

$$\frac{x_i}{y_i} * z_j = t_j$$

där  $j$  står för det län som ska skattas och  $i$  för intilliggande län i förhållande till län  $j$ .

$i, j$  = Stockholms län, Uppsala län, ..., Norrbottens län

$x_i$  = prognostiserade hektarskörden för vårrybs i län  $i$

$y_i$  = prognostiserade hektarskörd för havre i län  $i$

$z_j$  = prognostiserade hektarskörd för havre för län  $j$

$t_j$  = skattad hektarskörd för län  $j$

För att beräkna genomsnittlig hektarskörd för varje gröda behövs alla stödansökta arealer fördelade per gröda och län. De hämtas från ett register, IAKS med hjälp av verktyget/programmet DAWA, och används enligt nedan. Den genomsnittliga hektarskörden är ett viktat medelvärde.

$$y_i = \frac{\sum(x_j * z_j)}{\sum z_j}$$

där  $i$  = Höstvet, vårvete, ..., vårrybs.

där  $j$  = Stockholms län, Uppsala län, ..., Norrbottens län.

$y_i$  = rikets genomsnittliga hektarskörd för gröda  $i$

$x_j$  = skattad hektarskörd för län  $j$

$z_j$  = odlad areal i län  $j$

I första steget beräknas hektarskördar för grödor som enbart beror på vårkorn samt andra län för samma gröda, det vill säga höstvetete, vårvete och havre. I det andra steget beräknas hektarskördar för de grödor som enbart beror på höstvetete och havre samt andra län, alltså höstråg och höstraps respektive vårraps och vårrybs. I sista steget beräknas de grödor som det inte finns hektarskördar för i några län, det vill säga höstrågvete, vårrågvete, höstkorn, blandsäd och höstrybs.

De odlade arealerna används också vid uppskattning av totalskördarna. Varje läns uppskattade hektarskörd multipliceras med dess odlade areal för varje enskild gröda. Då fås en totalskörd per län på respektive gröda. Dessa skördar summeras ihop till en totalskörd på riksnivå per gröda. Tilläggas bör då också att en del av den areal som hämtas ur registret om stödansökta arealer är vid uttagstidpunkten ej regionbestämd. Så denna areal måste också multipliceras med den viktade hektarskörden för riket för aktuell gröda och adderas till denna summa. Summan av alla spannmålsgrödors totalskördar blir sen totalskörden för spannmål. Samma procedur för oljeväxter.

### 2.7.3 Skattningsförfarande för tillförlitlighet

Inga osäkerhetsmått tas fram för undersökningen.

### 2.7.4 Röjandekontroll

Röjandekontroll görs inte. Statistiken redovisas endast på riksnivå vilket gör att risken för att uppgifter för ett enskilt jordbruksföretag ska röjas är i stort sett obefintlig.

## 3 Genomförande

I maj börjar arbetet med att excelfiler uppdateras med data för förra årets skördar och väder. För varje län finns det en excelfil där alla hektarskördar för de ingående grödorna samt väderdata som går tillbaka till år 1965. Dessa filer ska nu uppdateras med de väderdata som vi fått från SMHI. Filerna ska även uppdateras med alla definitiva hektarskördar för föregående år för de aktuella grödorna. En fil som innehåller hektarskördar och totalskördar på riksnivå ska

uppdateras med föregående års skördar. Detta görs för att kunna räkna ut snittet för de senaste fem åren.

I början av augusti uppdateras även excelfilerna med väderdata för juni och juli månad som hämtas eller beställs från SMHI. När alla excelfiler för varje län är uppdaterade så är det dags att lyfta in alla dessa filer i SAS och där göra linjära regressionsmodeller för varje län och varje gröda, som är aktuell för respektive län. Resultaten matas in i en annan excelfil. I denna fil matar vi även in alla odlade arealer som vi hämtar från IAKS, alltså alla arealer som jordbruksföretagen sökt stöd för. Informationen hämtas, med hjälp av programmet DAWA. För 2021 hämtades informationen den 12 augusti. I excelfilen räknas det ut ett viktat medelvärde för varje grödas hektarskörd på riksnivå samt totalskörd på riksnivå. Totalskörden fås genom multiplicera varje läns hektarskörd med de odlade arealerna för samma län och sedan summera dem på riksnivå. Därefter kan en totalskörd räknas för spannmål respektive oljeväxter.

En statistikrapport börjar skrivas. Rapporten korrekturläses och granskas sedan av en grupp personer på enheten som läser igenom texten, går igenom tabeller och diagram, bedömer rimlighet och ger sina synpunkter på detta. Om fel eller oklarheter upptäcks, rättas dessa till.

Då denna prognos brukar få viss uppmärksamhet av media så vänder vi oss till informationsavdelningen på Jordbruksverket och får hjälp med att skriva ett pressmeddelande som ska publiceras i samband med rapporten publiceras.

Prognosen publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas och som ett pressmeddelande och en statistikrapport på Jordbruksverkets webbplats.

### **3.1 Kvantitativ information**

Totalskörden för spannmål förväntas bli strax under 5,7 miljoner ton och totalskörden för oljeväxter förväntas bli 0,38 miljoner ton för 2021.

### **3.2 Avvikelser från undersökningsdesignen**

Inga avvikelser har förekommit utan undersökningen har genomfört som planerat.

## Bilaga A

### Väderstationer

LnKod	Län	Nederbörd		Temperatur	
		Station	stationsnr	Station	stationsnr
01	Stockholm	Sjögärde	87590	Stockholm-Bromma	97200
01	Stockholm	Adelsö A	97280	Adelsö A	97280
01	Stockholm	Vallentuna	98310	Berga	98040
03	Uppland	Enköping	97380	Enköping	97370
03	Uppsala	Uppsala	97520	Uppsala aut	97510
03	Uppland	Vattholma D	107010	Film A	107140
04	Södermanland	Åda	87580	Oxelösund	87400
04	Södermanland	Floda A	96040	Floda A	96040
04	Södermanland	Eskilstuna	96230	Eskilstuna A	96190
05	Östergötland	Linköping-Malmslätt	85240	Linköping-Malmslätt	85240
05	Östergötland	Motala	85330	Kettstaka A	85460
05	Östergötland	Norrköping-SMHI	86340	Norrköping-SMHI	86340
06	Jönköping	Malmbäck D	74360	Hagshult	74180
06	Jönköping	Prästkulla	74440	Prästkulla	74440
06	Jönköping	Ramsjöholm	74490	Ramsjöholm	74490
07	Kronoberg	Ljungby D	63500	Ljungby A	63510
07	Kronoberg	Växjö A	64510	Växjö A	64510
07	Kronoberg	Lessebo	65450	Kosta	65510
08	Kalmar	Segerstad	66220	Ölands södra udde A	66110
08	Kalmar	Kalmar D	66430	Kalmar flygplats	66420
08	Kalmar	Oskarshamn	76160	Oskarshamn	76160
09	Gotland	Hemse	78140	Hoburg A	68560
09	Gotland	Visby D	78390	Hemse	78140
09	Gotland	Hejnum	78420	Visby flygplats	78400
10	Blekinge	Karlshamn	64130	Karlshamn	64130
10	Blekinge	Lyckeby	65120	Karlskrona-Söderstjerna	65090
10	Blekinge	Ronneby-Bredåkra	65160	Ronneby-Bredåkra	65160
12	Skåne	Malmö A	52350	Malmö A	52350
12	Skåne	Tomelilla	53320	Skillinge A	54290
12	Skåne	Tånga	62120	Ängelholm-Barkåkra Flygplats	62180
13	Halland	Halmstad flygflottilj	62410	Halmstad flygplats	62410
13	Halland	Varberg	72080	Varberg	72080
13	Halland	Ullared	72090	Ullared	72090
14	Västra Götaland	Sätenäs	82260	Sätenäs	82260
14	Västra Götaland	Skara	83270	Skara	83270
14	Västra Götaland	Mariestad	83440	Mariestad	83440
17	Värmland	Säffle	92100	Säffle	92100
17	Värmland	Väse D	93210	Karlstad flygplats	93220
17	Värmland	Kristinehamn	94180	Kristinehamn	94180

## Bilaga A

LnKod	Län	Nederbörd		Temperatur	
		Station	stationsnr	Station	stationsnr
18	Örebro	Asker D	95100	Kilsbergen-Suttarboda A	94190
18	Örebro	Örebro D	95160	Örebro flygplats	95130
18	Örebro	Ön	95240	Kloten A	95540
19	Västmanland	Kolsva D	95360	Västerås	96350
19	Västmanland	Västerås	96350	Sala	96550
19	Västmanland	Sala	96550		
20	Dalarna	Ockelbo 1	105310	Borlänge Flygplats	105260
20	Dalarna	Falun-Lugnet	105370	Falun-Lugnet	105370
20	Dalarna	Borlänge	106070	Avesta	106070
21	Gävleborg	Ockelbo 1	106540	Åmot A	106570
21	Gävleborg	Sidsjö D	116170	Järvsö	116430
21	Gävleborg	Järvsö	116430	Hudiksvall	117440
22	Västernorrland	Sidsjö D	127220	Torpshammar A	126290
22	Västernorrland	Multrå	137090	Sundsvall-Timrå Flygplats	127310
22	Västernorrland	Örnsköldsvik	138180	Forse	137080
23	Jämtland	Dödre	124480	Mörsil	133190
23	Jämtland	Tullus D	134190	Frösön	134110
23	Jämtland	Bölestrand	136610	Krångede A	136090
24	Västerbotten	Tavelsjö D	150020	Umeå flygplats	140480
24	Västerbotten	Grönliden	150440	Lycksele A	148330
24	Västerbotten	Lövånger	151220	Skellefteå Flygplats	151380
25	Norrbotten	Piteå	161790	Piteå	161790
25	Norrbotten	Kalix D	163940	Boden Mo	161940
25	Norrbotten	Harads D	170670	Övertorneå	173810







