

Instruktion för preliminär desinfektion i samband med A-sjukdom

Preliminär desinfektion utförs för att snabbt avdöda smittämnet i miljön och att därmed minska risken för smittspridning i samband med efterföljande sanering.

Arbetsgång

Preliminärdesinfektionen ska ske i följande steg:

Besprutning av djuren¹

Påbörja preliminärdesinfektionen snarast efter avlivning av alla djur. Bespruta alla döda djur med desinfektionsmedel där de ligger. Kadavren behöver inte vändas eller hanteras av personalen som desinfekterar.

Avlägsnande av djuren

De besprutade hela kropparna eller delarna av de döda djuren ska avlägsnas från byggnaden.

Desinfektion av byggnader, ytor, utrustning och markområden

De delar av anläggningen där djuren har hållits samt alla delar av andra byggnader, ytor eller utrustning som kontaminerats under avlivning, undersökning eller provtagning besprutas med desinfektionsmedel.

Desinfektionsmedlet ska appliceras på:

- golv och inredning
- strö, ströbäddar och gödsel
- väggar upp till den nivå som djuren bedöms kunna nå

Tak behöver inte besprutas med desinfektionsmedel och inte heller de övre delarna av väggarna som djuren inte kan nå.

¹ Observera att detta även innefattar eventuella avlivade ruvade kläckägg den sista tredjedelen av ruvningen.

Observera att strö, använda ströbäddar och gödsel ska vara ordentligt indränkta med desinfektionsmedel.

Desinfektionsmedel och applicering

Använd ett desinfektionsmedel som är verksamt mot det aktuella smittämnet, t ex Parvocide (koncentration 1:150 det vill säga ca 0,7 % lösning) eller annat varumärke med motsvarande egenskaper. För markområden används i regel släckt kalk.

Applicera desinfektionsmedlet med koncentratspruta eller ryggspruta, eller sprayflaska för mindre ytor. Du kan också använda vissa högtryckstvättar, men då inte under högt tryck. Spraya på medlet i tillräcklig mängd så man ser att dropparna flyter ihop. Allt ska fuktas så att damm lägger sig, men det ska inte bli någon avrinning av desinfektionsmedel.

Låt desinfektionsmedlet verka i 24 timmar innan andra åtgärder vidtas på platsen.

Den officiella veterinären ska övervaka och intyga att preliminärdesinfektionen har utförts på EPI 16 (finns i Jordbruksverkets webbutik).

Observera att de som utför preliminärdesinfektionen ska följa samma smittskyddsrutiner som annan personal som arbetar på anläggningen.

Sanering vid minusgrader

För att undvika att desinfektionsmedlet fryser vid minusgrader ska propylenglykol först tillsättas till vattnet som sedan blandas med desinfektionsmedlet.

Temperatur där desinfektionsmedlet ska verka (°C)	Koncentration av propylenglykol som ska tillredas (%)	Andelar propylenglykol och vatten som ska blandas
-5	15	150 ml propylenglykol/850 ml vatten
-13	30	300 ml propylenglykol/700 ml vatten
-20	35	350 ml propylenglykol/650 ml vatten
-25	40	400 ml propylenglykol/600 ml vatten
-30	45	450 ml propylenglykol/550 ml vatten
-35	50	500 ml propylenglykol/500 ml vatten

Exempel: Om det är -5 °C och det behövs 10 liter färdigblandad desinfektionslösning ska 1.5 liter propylenglykol blandas med 8,5 liter vatten och därefter tillsätts desinfektionsmedlet.

Om du har frågor

Djurhållare

Om du har frågor om utförandet av preliminärdesinfektionen ska du ställa dem till den officiella veterinären på plats på gården.

Veterinär

Om du har frågor kan du kontakta oss via samma e-post som du fick detta dokument från.

Lagstöd

Lagstöd för denna arbetsgång finns i:

- bilaga IV till kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/687 av den 17 december 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om förebyggande och bekämpning av förtecknade sjukdomar, och
- kapitel 5 i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVSF 2023:15) om förebyggande och bekämpning av vissa djursjukdomar.